


โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

Zika Virus Disease



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีความสัมพันธ์กับภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด (Microcephaly) ในทารกแรกเกิดกับการติดเชื้อไวรัสซิกา มีการระบาดมากในประเทศแถบอเมริกาใต้และแถบแคริบเบียน

การแพร่เชื้อ ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

สามารถแพร่เชื้อโดยยุงลายที่มีเชื้อ
และไปกัดคน หลังจากได้รับเชื้อจะมีระยะฟักตัว
3-12 วัน (เฉลี่ย 4-7 วัน)
ส่วนใหญ่ 80% ของผู้ติดเชื้อ
จะไม่แสดงอาการ



อาการของ ผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา

- มีไข้
- มีผื่นแดง
- เยื่อบุตาอักเสบ
- ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ
- อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ



การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันเฉพาะ
หรือยาฆ่าเชื้อจำเพาะ
การรักษาจะทำการรักษาตามอาการ
อาการไม่รุนแรง หายได้เองใน 2-7 วัน



การป้องกัน

โดยป้องกันไม่ให้ยุงกัด
และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590 3159
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
<http://beid.ddc.moph.go.th>



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

